




**FAUCON**  
ÉMERILLON



**BERNACHE**  
DU CANADA



**CORNEILLE**  
D'AMÉRIQUE



**QUISCALE**  
BRONZÉ

**GOÉLAND**  
À BEC CERCLÉ



**ROSELIN**  
FAMILIER



**CHARDONNERET**  
JAUNE

**ROSELIN**  
POURPRÉ



**VACHER**  
À TÊTE BRUNE



**MOINEAU**  
DOMESTIQUE





COVID-19

## DES OISEAUX À LA MAISON

### PLANCHE 3

#### **Bernache du Canada**

Très nombreuse durant la période de migration. Remarquez son cri, souvent sur deux notes, alors que le cri de l'Oie des neiges n'est que sur une seule note.

#### **Chardonneret jaune**

Impossible de confondre le mâle. La femelle, jaune et beige, est plus difficile à reconnaître. Remarquez les ailes noires arborant une ligne blanche assez large. Son chant est un gazouillis enjoué. En vol, on peut entendre son cri distinctif qui ressemble à « piou piou piou piou ». Fréquente les mangeoires.

#### **Corneille d'Amérique**

Souvent observée pourchassant les corbeaux et même les hiboux : un chœur de corneilles alertées signifie qu'un prédateur n'est pas loin! Plus petite que le corbeau. La queue de la corneille est en forme d'éventail alors que celle du corbeau est en forme de losange.

#### **Faucon émerillon**

Petit faucon souvent aperçu perché dans une grande épinette. D'abord forestier, mais bien adapté aux paysages de banlieue. Cri très perçant et insistant.

#### **Goéland à bec cerclé**

Le goéland observé le plus souvent dans les centres urbains. Non, ce n'est pas une mouette! Notez le cercle noir au bout de son bec et ses pattes jaunes.

#### **Moineau domestique**

Introduit d'Europe. On ne prend pas souvent le temps de l'observer, et pourtant, il rend plus vivantes nos ruelles et nos cours. Le mâle arbore un plastron noir alors que la femelle est brune. Se nourrit au sol et dans les mangeoires. Se dissimule souvent dans les haies. Ses populations ont beaucoup décliné dans les dernières décennies.

#### **Quiscale bronzé**

Souvent confondu avec la corneille, mais cette dernière est plus grande. Il paraît noir, mais si vous le regardez en plein soleil, vous comprendrez l'origine de son nom. Corps bronzé, tête iridescente. Au vol, on le reconnaît à sa queue très longue et très large. Fréquente les mangeoires.

### **Roselin familier et Roselin pourpré**

Les femelles sont souvent confondues avec le moineau. Leur silhouette est toutefois plus élancée et le plumage, plus ligné. Le mâle des deux espèces arbore une tête rouge framboise (R. pourpré) ou rouge brique (R. familier). Les deux oiseaux fréquentent les mangeoires. Dans les villes et les banlieues du sud du Québec, le Roselin familier est habituellement le plus commun alors que le Roselin pourpré préfère les milieux plus forestiers. Plus au nord, le Roselin pourpré est plus répandu.

### **Vacher à tête brune**

Notre seul oiseau « parasite » : pond ses œufs dans le nid des autres espèces. Surtout présent à la campagne. Tête brune bien visible. Un peu plus petit que le carouge.